

Scheda del paziente Rivaroxaban NOBEL



Rivaroxaban NOBEL 10 mg

Rivaroxaban NOBEL 15 mg

Rivaroxaban NOBEL 20 mg

Tenga sempre questa scheda con sé.

Mostri questa scheda ad ogni medico o dentista prima di un trattamento.

Io sono in trattamento anticoagulante con rivaroxaban.

Nome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Peso:

Altri medicinali:

Altre condizioni:

In caso di emergenza informi:

Nome del medico:

Telefono del medico:

Timbro del medico:

In caso di emergenza, informare anche:

Nome:

Numero di telefono:

Tipo di relazione:

Informazioni per il personale sanitario

I valori di INR non devono essere considerati perché non sono un valore che dipende dall'attività anticoagulante di Rivaroxaban NOBEL.

Cosa devo sapere su Rivaroxaban NOBEL?

- Rivaroxaban NOBEL fluidifica il sangue, prevenendo la formazione di pericolosi coaguli.
- Rivaroxaban NOBEL deve essere preso esattamente secondo quanto prescritto dal medico. Per assicurare una protezione ottimale dai coaguli, non saltare mai una dose.
- Non deve mai smettere di prendere Rivaroxaban NOBEL senza parlarne prima col medico, perché il rischio di formazione di coaguli può aumentare.
- Informi il vostro medico o farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o ha intenzione di assumere qualsiasi altro medicinale, prima di prendere Rivaroxaban NOBEL.
- Informi il vostro medico che sta assumendo Rivaroxaban NOBEL prima di ogni intervento chirurgico o procedura invasiva.

Quando devo chiedere consiglio al mio medico o farmacista?

Quando si prende un fluidificante del sangue come Rivaroxaban NOBEL è importante essere informati sui possibili effetti indesiderati. Il sanguinamento rappresenta l'effetto indesiderato più comune.

Non cominci a prendere Rivaroxaban NOBEL se sa di essere a rischio di insoliti sanguinamenti senza averne prima discusso col medico.

Informi immediatamente il vostro medico o farmacista se ha segni o sintomi di sanguinamento come i seguenti:

- Dolore
- Gonfiore o disagio
- Mal di testa, capogiro o debolezza
- Lividi insoliti, sanguinamento dal naso, dalle gengive o sanguinamento prolungato o molto abbondante da ferite da taglio
- Flusso mestruale o sanguinamento vaginale più intensi del solito
- Sangue nelle urine che possono risultare rosa o marroni, feci rosse o nere
- Tosse con sangue, o vomito con sangue o con materiale che sembra fondo di caffè

Come prendo Rivaroxaban NOBEL?

Per assicurare una protezione ottimale:

- Rivaroxaban NOBEL 10 mg può essere preso con o senza cibo
- Rivaroxaban NOBEL 15 mg deve essere preso durante i pasti
- Rivaroxaban NOBEL 20 mg deve essere preso durante i pasti